

- Instrucciones:**
- a) **Duración: 1 hora y 30 minutos.**
 - b) Elija y desarrolle una opción completa, sin mezclar cuestiones de ambas. Indique, **claramente**, la opción elegida.
 - c) No es necesario copiar la pregunta, basta con poner su número.
 - d) Se podrá responder a las preguntas en el orden que desee.
 - e) Puntuación: Cuestiones (nº 1,2,3 y 4) hasta 1'5 puntos cada una. Problemas (nº 5 y 6) hasta 2 puntos cada uno.
 - f) Exprese sólo las ideas que se piden. Se valorará positivamente la concreción en las respuestas y la capacidad de síntesis.
 - g) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos.

OPCIÓN A

- 1.- Formule o nombre los compuestos siguientes: a) Dióxido de azufre b) Ácido hipobromoso
c) Buta-1,3-dieno d) Na_2O_2 e) BaCO_3 f) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COCH}_3$
- 2.- a) ¿Qué caracteriza, desde el punto de vista de la configuración electrónica, a un metal de transición?
b) Indique la configuración electrónica del ion hierro (II) y justifique la existencia de ese estado de oxidación.
c) ¿Por qué existen siete clases de orbitales f?
- 3.- Se dispone de una disolución acuosa de AgNO_3 1 M.
a) Si se sumerge un alambre de cobre, ¿se oxidará? Justifique la respuesta.
b) Si el alambre fuese de oro, ¿se oxidaría? Justifique la respuesta.
c) Si se produce reacción, escriba y ajuste la ecuación correspondiente.
Datos: $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0'80 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0'34 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Au}^{3+}/\text{Au}) = 1'50 \text{ V}$
- 4.- a) Escriba la ecuación de la reacción de adición de un mol de cloro a un mol de etino.
b) Indique la fórmula desarrollada de los posibles isómeros obtenidos en el apartado anterior.
c) ¿Qué tipo de isomería presentan los compuestos anteriores?
- 5.- Para la obtención del tetracloruro de carbono según: $\text{CS}_2(\text{l}) + 3 \text{Cl}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CCl}_4(\text{l}) + \text{S}_2\text{Cl}_2(\text{l})$
a) Calcule el calor de reacción, a presión constante, a 25 °C y en condiciones estándar.
b) ¿Cuál es la energía intercambiada en la reacción anterior, en las mismas condiciones, cuando se forma un litro de tetracloruro de carbono cuya densidad es 1'4 g/mL?
Datos: $\Delta H_f^\circ[\text{CS}_2(\text{l})] = 89'70 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_f^\circ[\text{CCl}_4(\text{l})] = -135'4 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_f^\circ[\text{S}_2\text{Cl}_2(\text{l})] = -59'8 \text{ kJ/mol}$.
Masas atómicas: C = 12; Cl = 35'5.
- 6.- A 25 °C el producto de solubilidad en agua del AgOH es $2 \cdot 10^{-8}$. Para esa temperatura, calcule:
a) La solubilidad del compuesto en g/L.
b) La solubilidad del hidróxido de plata en una disolución de pH = 13.
Masas atómicas: Ag = 108; O = 16; H = 1.

- Instrucciones:**
- a) **Duración: 1 hora y 30 minutos.**
 - b) Elija y desarrolle una opción completa, sin mezclar cuestiones de ambas. Indique, **claramente**, la opción elegida.
 - c) No es necesario copiar la pregunta, basta con poner su número.
 - d) Se podrá responder a las preguntas en el orden que desee.
 - e) Puntuación: Cuestiones (nº 1,2,3 y 4) hasta 1'5 puntos cada una. Problemas (nº 5 y 6) hasta 2 puntos cada uno.
 - f) Exprese sólo las ideas que se piden. Se valorará positivamente la concreción en las respuestas y la capacidad de síntesis.
 - g) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos.

OPCIÓN B

- 1.- Formule o nombre los compuestos siguientes: **a)** Seleniuro de hidrógeno **b)** Hidróxido de cobalto (II)
c) Propilamina **d)** PbCrO_4 **e)** Au_2O_3 **f)** $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
- 2.- Se tiene una mezcla de 10 g de hidrógeno y 40 g de oxígeno.
- a) ¿Cuántos moles de hidrógeno y de oxígeno contiene la mezcla?
 - b) ¿Cuántas moléculas de agua se pueden formar al reaccionar ambos gases?
 - c) ¿Cuántos átomos del reactivo en exceso quedan?
- Masas atómicas: H = 1; O = 16.
- 3.- Dadas las siguientes sustancias: Cu, CaO, I_2 , indique razonadamente:
- a)Cuál conduce la electricidad en estado líquido pero es aislante en estado sólido.
 - b)Cuál es un sólido que sublima fácilmente.
 - c)Cuál es un sólido que no es frágil y se puede estirar en hilos o láminas.
- 4.- Justifique, mediante las reacciones correspondientes, el comportamiento de una disolución amortiguadora formada por ácido acético y acetato de sodio, cuando se le añaden pequeñas cantidades de:
- a)Un ácido fuerte, como HCl.
 - b)Una base fuerte, como KOH.
- 5.- Se mezclan 200 g de hidróxido de sodio y 1000 g de agua resultando una disolución de densidad 1'2 g/mL. Calcule:
- a)La molaridad de la disolución y la concentración de la misma en tanto por ciento en masa.
 - b)El volumen de disolución acuosa de ácido sulfúrico 2 M que se necesita para neutralizar 20 mL de la disolución anterior.
- Masas atómicas: Na = 23; O = 16; H = 1.
- 6.- El permanganato de potasio oxida al sulfato de hierro (II) en medio ácido sulfúrico, para dar sulfato de manganeso (II), sulfato de hierro (III), sulfato de potasio y agua.
- a)Ajuste la ecuación iónica y la molecular del proceso por el método del ion-electrón.
 - b)Calcule el volumen de una disolución de permanganato de potasio 0'02 M que se requiere para oxidar 40 mL de disolución de sulfato de hierro (II) 0'1 M.