

# Evaluación para el Acceso a la Universidad Curso 2019/2020



## Materia: MATEMÁTICAS II

**Instrucciones:** El estudiante deberá resolver **CUATRO** ejercicios, si resuelve más, se corregirán solo los cuatro primeros. Los ejercicios deben redactarse con claridad, detalladamente y razonando las respuestas. Se podrá utilizar cualquier tipo de calculadora. Cada ejercicio completo puntuará 2,5 puntos. Duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos.

1. a) [1,25 puntos] Determina razonadamente los valores de  $a$  para los que la matriz  $A$  no tiene inversa

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a+1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & a \\ a & 0 & 1 & 0 \\ a & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

- b) [1,25 puntos] Calcula razonadamente todos los posibles valores  $x, y, z$  para que el producto de las matrices  $C = \begin{pmatrix} x & 1 \\ y & z \end{pmatrix}$  y  $D = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$  conmute.
2. a) [1,75 puntos] Discute el siguiente sistema de ecuaciones lineales en función del parámetro  $a \in \mathbb{R}$ :

$$\begin{cases} ax & -ay & -z & = & a \\ ax & -ay & & = & a \\ ax & +2y & -z & = & 1 \end{cases} .$$

- b) [0,75 puntos] Resuelve razonadamente el sistema anterior para  $a = 2$ , si es posible.
3. Dada la función

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{x-2} & \text{si } x < 2 \\ \cos(\pi x) & \text{si } 2 \leq x \leq 3 \\ \frac{\ln(x-2)}{3-x} & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

- a) [1,5 puntos] Determina razonadamente los puntos en los que la función es continua, calcula los puntos en los que es discontinua y clasifica el tipo de discontinuidad, si los hubiera.
- b) [1 punto] Calcula razonadamente el siguiente límite:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^{-x}}{1+2x-\cos(x^2)}$ .
4. Sea la función  $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 + 1}$ .
- a) [1,5 puntos] Halla razonadamente las coordenadas de los extremos relativos de la función  $f(x)$  y clasifícalos.
- b) [1 punto] Calcula la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal a la gráfica de la función  $f(x)$  en el punto de abscisa  $x = 0$ .
5. a) [1,25 puntos] Calcula razonadamente la siguiente integral:  $\int \frac{3x-2}{x^2-2x+1} dx$ .
- b) [1,25 puntos] Calcula, justificadamente, el área acotada del recinto limitado por la gráfica de la función  $g(x) = -x^3 + 2x^2 + 3x$  y el eje de abscisas.

# Evaluación para el Acceso a la Universidad Curso 2019/2020



**Materia: MATEMÁTICAS II**

**Instrucciones:** El estudiante deberá resolver **CUATRO** ejercicios, si resuelve más, se corregirán solo los cuatro primeros. Los ejercicios deben redactarse con claridad, detalladamente y razonando las respuestas. Se podrá utilizar cualquier tipo de calculadora. Cada ejercicio completo puntuará 2,5 puntos. Duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos.

6. Dados los planos  $\pi_1 \equiv 2x + y + z - 2 = 0$  y  $\pi_2 \equiv \begin{cases} x = -1 + \lambda - \mu \\ y = -\lambda + \mu \\ z = -2 + 2\lambda \end{cases}$ .

- a) [1 punto] Calcula razonadamente el ángulo que forman los dos planos.  
 b) [1,5 puntos] Halla razonadamente el volumen del tetraedro formado por el punto  $P(3, -3, 2)$  y los puntos de corte del plano  $\pi_1$  con los ejes coordenados.

7. Dados el plano  $\pi \equiv \begin{cases} x = -1 + \mu \\ y = 1 + \lambda + a\mu \\ z = 1 + 2\lambda - \mu \end{cases}$  y la recta  $s \equiv \begin{cases} x - 2y = 1 - b \\ z = -3 \end{cases}$ .

- a) [1,5 puntos] Calcula razonadamente el valor de los parámetros  $a$  y  $b$  para que la recta  $s$  esté contenida en el plano  $\pi$ .  
 b) [1 punto] Si  $a = 0$  y  $b = 3$ , calcula razonadamente la ecuación en forma implícita de la recta  $r$  que pasa por el punto  $P(1, -1, -8)$  es paralela al plano  $\pi$  y perpendicular a la recta  $s$ .
8. a) En un servicio de emergencias el 60% de los avisos que se reciben se clasifican con el código amarillo, el 30% con el naranja y el 10% con el rojo. Se sabe que el porcentaje de avisos recibidos que son falsas alarmas es 3% en el caso de código amarillo, 2% en el naranja y 1% en el rojo. Si se recibe un aviso,  
 a.1) [0,5 puntos] ¿qué probabilidad hay de que se trate de una falsa alarma?  
 a.2) [0,75 puntos] Si se sabe que el aviso recibido no ha sido falsa alarma, ¿qué probabilidad hay de que haya sido un aviso código rojo o naranja?  
 b) Si en una centralita se reciben 9 avisos,  
 b.1) [0,5 puntos] ¿Qué probabilidad hay de que la centralita reciba 2 o menos avisos naranjas?  
 b.2) [0,75 puntos] ¿Qué probabilidad hay de que todos los avisos sean amarillos o naranjas?

n	k	p													
		0.01	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.33	0.35	0.40	0.45	0.49	0.50	
9	0	0.9135	0.6302	0.3874	0.2316	0.1342	0.0751	0.0404	0.0272	0.0207	0.0101	0.0046	0.0023	0.0020	
	1	0.0830	0.2985	0.3874	0.3679	0.3020	0.2253	0.1556	0.1206	0.1004	0.0605	0.0339	0.0202	0.0176	
	2	0.0034	0.0629	0.1722	0.2597	0.3020	0.3003	0.2668	0.2376	0.2162	0.1612	0.1110	0.0776	0.0703	
	3	0.0001	0.0077	0.0446	0.1069	0.1762	0.2336	0.2668	0.2731	0.2716	0.2508	0.2119	0.1739	0.1641	
	4	0.0000	0.0006	0.0074	0.0283	0.0661	0.1168	0.1715	0.2017	0.2194	0.2508	0.2600	0.2506	0.2461	
	5	0.0000	0.0000	0.0008	0.0050	0.0165	0.0389	0.0735	0.0994	0.1181	0.1672	0.2128	0.2408	0.2461	
	6	0.0000	0.0000	0.0001	0.0006	0.0028	0.0087	0.0210	0.0326	0.0424	0.0743	0.1160	0.1542	0.1641	
	7	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0003	0.0012	0.0039	0.0069	0.0098	0.0212	0.0407	0.0635	0.0703	
	8	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0004	0.0008	0.0013	0.0035	0.0083	0.0153	0.0176	
	9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0003	0.0008	0.0016	0.0020	